



www.JeffersonCountyPublicHealth.org



www.jeffcoec.org

NOTA DE PRENSA

28 de enero, 2022

Dos clínicas de vacunación programadas para febrero

CONDADO DE JEFFERSON— Dos clínicas de vacunación se llevarán a cabo en febrero. Los detalles son los siguientes:

Fecha: Sábado, 12 de febrero

Hora: 1:30-3:30 PM

Ubicación: Centro Comunitario de Brinnon

Vacunas: Pfizer para mayores de 5 años, Moderna para mayores de 18 años (primera, segunda o dosis de refuerzo)

Se recomienda hacer cita. Sin cita previa también serán atendidos:

<https://prepmo.doh.wa.gov/appointment/en/reg/2012536969> o llame al 360-344-9791.

Fecha: Sábado, 19 de febrero

Hora: 9-11 AM

Ubicación: Chimacum Junior/Senior High School, Sala de Usos Múltiples

Vacunas: Pfizer para mayores de 5 años, Moderna para mayores de 18 años (primera, segunda o dosis de refuerzo)

Se recomienda hacer cita. Sin cita previa también serán atendidos:

<https://prepmo.doh.wa.gov/appointment/en/reg/1652990603> o llame al 360-344-9791.

Las clínicas están organizadas y operadas por el Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Jefferson y Salud Pública del Condado de Jefferson.

Más información sobre elegibilidad/combine & mezcle:

- Debe recibir su refuerzo de Moderna 5 meses después de recibir su segunda dosis. **Los refuerzos de Moderna son la mitad de la dosis de una primera o segunda dosis.**
- También puede recibir un refuerzo de Moderna si han pasado 5 meses de su segunda dosis de Pfizer o 2 meses después de su vacuna Johnson & Johnson.
- Si está inmunocomprometido de moderada a grave, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que reciba una tercera dosis completa. (Los refuerzos de Moderna son ½ dosis). **Las terceras dosis completas NO se ofrecerán en estas clínicas.** Los refuerzos para este grupo de población se recomiendan 5 meses después de la tercera dosis. Sin embargo, algunas farmacias aún no están preparadas para administrar esos refuerzos. Comuníquese con su proveedor de atención médica para programar una tercera dosis o el refuerzo.

Traiga su prueba de vacunación si programó para la segunda dosis o para los refuerzos.

Las pruebas de vacunación incluyen la tarjeta de vacunas o una copia de los registros del Departamento de Salud del Estado de Washington Washington [State Department of Health], que pueden conseguirse de manera gratuita en la siguiente página <https://wa.myir.net/register>. Se aceptarán copias digitales o en papel de pruebas.

La clínica no reemplazará las tarjetas de vacunaciones. Si usted tiene una tarjeta de vacunaciones laminada, recibirá una tarjeta adicional que tendrá solamente la información de la dosis del refuerzo.

Otras maneras de recibir los refuerzos de la Moderna o la Pfizer:

Las vacunaciones están disponibles también en algunas farmacias locales o a través de su proveedor de salud. Haga click aquí para tener más información: <https://jeffersoncountypublichealth.org/1529/COVID-19-Vaccine>.

Vacunación para niños en edades entre 5-11: Lo que debe saber antes de ir

Prepare a su niño para lo que va a suceder:

- Tome en cuenta las inquietudes de su niño con respecto a recibir la vacuna.
- Si su niño tiene miedo por el dolor que puede causarle la aplicación de la vacuna, dígame que usted va a estar con él (ella) para que pueda apretarle la mano y todo pasará antes de contar hasta tres.
- Dígame que recibir la vacuna lo ayudará a estar sano y también contribuirá a que los que lo rodean estén saludables.

¿Qué debe traer a su cita?:

- Si aplica, traiga prueba de la primera dosis de la vacuna de su niño.
- Si es posible, trate que su niño use una camiseta con mangas cortas debajo de su chaqueta. Esto hará que los vacunadores tengan más fácil el acceso a la parte superior del brazo.
- Traiga un libro, su teléfono celular o su tableta para mantener a su niño ocupado mientras es monitoreado por los 15 minutos subsiguientes a la vacunación.
- Si usted trae más de un niño a la clínica de vacunación, considere traer a otra persona con usted para que lo (la) ayude.

Posibles efectos secundarios:

Su niño puede experimentar algunos efectos secundarios, con ambas dosis de la vacuna, tal como sucede con otras inmunizaciones. Estos efectos colaterales pueden incluir:

- Dolor, inflamación o enrojecimiento en el lugar de la vacuna
- Fiebre y escalofríos
- Dolor de cabeza
- Fatiga
- Dolor muscular y de las articulaciones

Estos efectos secundarios son leves y generalmente no duran más de 24-48 horas. Mientras ocurren dele a su niño muchos líquidos para beber, permítale que descanse más, y si fuese necesario puede darle medicinas de libre venta para aliviar el dolor, tales como ibuprofeno o acetaminofén. También puede colocar una bolsa de hielo en el sitio de la inyección para disminuir la sensibilidad local.